



**„M.Á.-SZOL
A SEBEK ZIPZÁRJA,
A TERMÉSZET AJÁNDÉKA.”**

Az M. Á.-SZOL termékek növényi kivonatokat és más biológiailag aktív természetes anyagokat tartalmaznak, melyek hámosító hatásúak, és támogatják a sérült szövetek gyógyulási folyamatait.

Alkalmazható állatokon, sérült (vágott, szúrt, horzsoltt, égett stb.) bőr-, és nyálkahártya felületek regenerációjának támogatására.

Az M.Á.-SZOL alkoholos oldat a kezelt felületen vékony, az egészséges szellőzést biztosító védőréteget képez, ezért az M.Á.-SZOL alkoholos oldattal kezelt sebek kötözése általában szükségtelen. A szer által alkotott védőréteg vízzel eltávolítható, ezért az állatok fürdését, vagy megázását követően a kezelést mielőbb meg kell ismételni. Ne engedjék, hogy az állatok a frissen felvitt védőréteget lenyalják!

Amennyiben az alkoholos permettel kezelt felület túlzottan kiszárad, vagy berepedezik, a pörk puhítására alkalmazza naponta 3x az M.Á.-SZOL alkoholos kenőcsöt vagy az M.Á.-SZOL PLUSZ alkoholos kenőcsöt.

Az M.Á.-SZOL PLUSZ alkoholos oldat és kenőcs speciális kiegészítő anyagokat is tartalmaz, ezért különösen alkalmas apró szívvá legyek által látogatott nyári sebek felületi kezelésére.

Az M.Á.-SZOL ecsetelő töményen kisebb, pontszerű, vízzel tízszerezésre hígított oldata pedig terjedelmesebb nyálkahártya sérülések kezelésére ajánlott, naponta 3x. Az ecsetelésre a szerrel, vagy annak hígított oldatával átitatott vatta tampon, fültisztító pálcikát használjon!

M.Á.-SZOL termékcsalád

KÜLSŐLEG!

KIZÁRÓLAG ÁLLATOK RÉSZÉRE ALKALMAZHATÓ, A DOBOZON FELTÜNTETETT HASZNÁLATI UTASÍTÁS SZERINT!

Vegye figyelembe, hogy alkohol tartalma miatt a szer az első néhány kezelési alkalommal égető érzést okozhat az állatnak, amire élesen reagálhat!

Ügyeljen arra, hogy a szer szembe ne kerüljön, ha ez mégis megtörténne, a sérült szemet bőszéges tiszta vízzel öblítse ki!

**A TERMÉK GYERMEKEKTŐL
ELZÁRVA TARTANDÓ!**

TŰZVESZÉLYES!
Tárolása 30 °C alatti hőmérsékleten,
fénytől védett helyen, saját
dobozában!

Tartalma: 50 ml.
Minőségét megőrzi a felbontástól
számított 6 hónapig.

Az Ön forgalmazója:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

A bőszéges, hideg vizes lemosással megtisztított, sérült bőrfelületet, száradást követően kb. 15-20 cm távolságból néhány perc különbséggel, 3x - 4x finoman bepermetezzük, vagy vékonyan bekenjük, a séült nyálkahártyát pedig finoman beecseteljük.

Ezt naponta 3x - 4x megismételjük, mindaddig, amíg a séült bőrfelületen ki nem alakul a pörk (3-4 nap) ill. el nem kezdődik a séült nyálkahártya jól látható regenerációja, majd naponta 2x, az újonnan kialakult hámszövet megerősödéséig.

AJÁNLÁS:

Az M.Á.-SZOL termékcsalád hámege-nerációt támogató tagjainak összetételét több éves munkával alakítottam ki. Eközben felhasználtam közel negyven éves gyakorló állatorvosi tapasztalataimat, alternatív és természetgyógyászati ismereteimet, valamint számos nagynevű elődömnök a fitoterápiás, apiterápiás és sebészeti szakirodalomban megjelent írását.

A termékcsalád sikeres kialakításához hozzájárultak azok a segítőkész állattulajdonosok is, akik az alkotó folyamat hosszú éveit alatt az egyes részfázisokat kipróbálták, véleményezték és értékelték, valamint azok a kiváló gyógyszerészek, akik a termékeket a megadott receptúra szerint elkészítették és csomagolták.

E nagyszerű közös tudományos és gyakorlati munka eredménye az M.Á.-SZOL termékcsalád valamennyi tagja, melyek egyik kiváló képviselőjét Ön most kezében tarja.

Választásához gratulálok és kívánom, hogy szükség esetén alkalmazza Ön is eredményesen a készítményt séült kedvenceinél!

„Hogyha bevált a szer, kérje majd máskor is, és ha úgy gondolja, ajánlja másnak is!”

*Dr. Mátray Árpád
homeopata állatorvos*